

واکسین هیپاتیت B

واکسین هیپاتیت B به تمام نوزادان توصیه می‌شود و محافظت مادام‌العمر را فراهم می‌کند.

طفل شما باید واکسین هیپاتیت B را در سنین ذیل دریافت کند:

- ولادت
- 1 – 2 ماهگی
- 6 – 18 ماهگی

## واکسین‌ها: بهترین گزینه برای وقایه.

اگر سوالی دارید، از ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی خود بپرسید.

برای معلومات اضافه درباره واکسین‌ها و مریضی مراجعه کنید به

[hhs.iowa.gov/public-health/immunization](https://hhs.iowa.gov/public-health/immunization)

[www.immunize.org](https://www.immunize.org)

[www.cdc.gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines)

[www.aap.org](https://www.aap.org)

## واکسین هیپاتیت B

برای داشتن یک زندگی بهتر خود را واکسین کنید!



IOWA™

Health and  
Human Services

Public Health

IOWA™

Health and  
Human Services

Public Health



## نوزادانی که از مادران HBV مثبت متولد می‌شوند، برای جلوگیری از عفونت به مراقبت بیشتری ضرورت دارند.

این نوزادان به گلوبولین مصنوعی هپاتیت B (HBIG) و آزمایشات اضافی در سنین زیر ضرورت دارند:

### تولد:

دوز تولد واکسین هپاتیت B و دوز HBIG طی 12 ساعت بعد از تولد

### 1 - 2 ماهگی:

دوز دوم واکسین HBV

### 6 ماهگی:

دوز سوم واکسین HBV

### 9 - 12 ماهگی:

ارائه‌دهندگان مراقبت‌های صحیح معاینه خون را برای تایید محافظت در مقابل HBV انجام می‌دهند

## چی‌قسم بفهمم که مصاب به HBV هستم؟

همه زنان حامله باید در سه ماهه اول هر حاملگی با معاینه خون برای سکرینگ HBV تست شوند. این یک گام مهم برای جلوگیری از انتشار HBV به نوزاد شما در بدو تولد است. از ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحیح خود، نتایج تست HBV خود را بخواهید.

## مطمئن شوید که طفل شما در بدو تولد واکسین شده است.

«دوز تولد» اولین دوز واکسین هپاتیت B است که بلافاصله بعد از تولد به نوزادان داده می‌شود. این کار برای محافظت در مقابل التهابات HBV در نوزادان انجام می‌شود. این کار برای محافظت در برابر عفونت HBV در نوزادان انجام می‌شود. التهاب هپاتیت B می‌تواند باعث التهاب مزمن کبد شود و در نتیجه خطر آفت مادام‌العمر کبد و سرطان کبد را در پی داشته باشد. سه دوز واکسین هپاتیت B از طفل شما در مقابل HBV محافظت می‌کند. واکسین هپاتیت B توصیه می‌شود و برای نوزادان نارس بی‌خطر است.

## آیا واکسین‌ها بی‌خطر هستند؟

واکسین‌ها در ایالات متحده ایمن و موثر هستند. عوارض جانبی رایج واکسین‌ها جزئی هستند و بشمول درد در جای تزریق واکسین یا تب خفیف می‌شوند. چنین علائم جزئی طبیعی است و مادامی که بدن معافیت ایجاد می‌کند، مورد انتظار است. عکس‌العمل‌های شدید بسیار نادر است. هر شخصی که واکسین را دریافت می‌کند باید بطور کامل از مزایا و مضرات آن مطلع شود. در صورت وجود هر نوع سوال یا تشویش باید آن را با ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحیح خود در میان بگذارید.

## هپاتیت B چیست؟

هپاتیت B (HBV) یک مریضی جدی است که به کبد حمله می‌کند و می‌تواند باعث عدم کفایه کبد، سرطان کبد و مرگ شود. با این صورت، HBV با یک واکسین امن و موثر قابل وقایه است.

## چی‌قسم اشخاص به هپاتیت B مبتلا می‌شوند؟

HBV در خون و مایعات بدن اشخاص مبتلا به التهاب هپاتیت B یافت می‌شود. HBV می‌تواند از ابتدای تولد از مادر به نوزاد سرایت کند. HBV همچنان می‌تواند از طریق اشتراک گذاری موارد ذیل منتقل شود:

• برس دندان

• تیغ

• سوزن تاتو و پیرسینگ

• از طریق رابطه جنسی محافظت نشده

حتی تماس با مقادیر کمی از خون آلوده می‌تواند باعث التهاب شود. HBV از طریق شیر دادن، سرفه، عطسه، بغل کردن یا بوسیدن منتقل نمی‌شود.

