

د هياتايت B واکسين

واکسينونه: په مخنيوي کې ستاسو تر ټولو غوره سته.

که تاسو د واکسينونو په اړه پوښتنې لرئ، نو د خپل روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.

د واکسينونو او ناروغيو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وگورئ

hhs.iowa.gov/public-health/immunization

www.immunize.org

www.cdc.gov/vaccines

www.aap.org

د هياتايت B واکسين

د لاینه ژوند لپاره د واکسين له لارې معافیت ترلاسه کړئ!



د هياتايت B واکسين د ټولو کوچنيو ماشومانو لپاره توصیه کيږي او د ژوند په اوږدو کې خونديتوب رامنځته کوي.

ستاسو ماشوم بايد په لاندي غمرونو کې د هياتايت B واکسين ترلاسه کړي:

- زيرون
- 1 - 2 مياشتي
- 6 - 18 مياشتي

IOWA™

Health and
Human Services

Public Health

IOWA™

Health and
Human Services

Public Health



هپاتایټ B څه دی؟

هپاتایټ (HBV) B یوه جدي ناروغي ده چې پر ینی بریدگره اغېزه کوي او کېدای شي د ینی له منځه وړلو، د ینی سرطان او ان مړینې لامل وگرځي. سره له دې، HBV د خوندي او موثر واکسین په تطبیقولو سره د مخنیوي وړ دی.

ځلک څنگه په هپاتایټ B اخته کېږي؟

HBV په هپاتایټ بی انتان باندې د اخته شویو کسانو په وینه یا د بدن په مایعاتو کې شتون لري. HBV د زېږون پر مهال له مور څخه ماشوم ته سرایت کولای شي. همدا راز، HBV د لاندې توکو د شریکولو له امله هم خپرېدلای شي:

- د غاښونو برسونه
- آسټري یا پاکي گاني
- د سوري کولو یا خال لگولو سنتي
- د ناخوندي جنسي اړیکې له لارې

ان د ککړي وینې له کوچني مقدار سره د تماس په صورت کې کېدای شي دغه ناروغي سرایت وکړي. HBV د مور شیدو خوړلو، ټوخي، عطسي، روغېر کولو یا مجولو له لارې سرایت نه کوي.

څنگه پوه شم چې HBV لرم او که نه؟

د HBV معاینې لپاره، ټولې امېدواري مېرمنې باید د هرې امېدواري په لومړۍ درې میاشتني دوره کې د وینې ټسټ ترلاسه کړي. د زېږون پر مهال ستاسو ماشوم ته د HBV له سرایت څخه د مخنیوي په موخه دغه پړاو خورا مهم دی. د خپل HBV ټسټ د پایلو ترلاسه کولو لپاره د روغتیايي پاملرنو خدماتو اړوند وړاندې کوونکي ته مراجعه وکړئ.

ډاډمن شئ چې ستاسو ماشوم له زېږون سره سم واکسین شوی دی.

«د زېږون دوز» د هپاتایټ B واکسین لومړنی دوز دی چې له زېږون سره سم ماشوم ته لگول کېږي. دا په نوی زېږېدلی ماشومانو کې د HBV انتاناتو په وړاندې د ساتنې لپاره ترسره کېږي. د هپاتایټ B انتان کېدای شي د ینی مزمن عفونت لامل وگرځي او په پایله کې د ژوند په اوږدو کې د ینی له منځه وړلو او د ینی سرطان وېره رامنځته کړي. د هپاتایټ B واکسین درې دوزونه به ستاسو ماشوم د HBV پر وړاندې پوره خوندي کړي. تر وخت مخکې نوزېږو ماشومانو لپاره د هپاتایټ B واکسین خوندي دی او توصیه کېږي.

ایا واکسینونه خوندي دي؟

په متحده ایالاتو کې واکسینونه خوندي او اغېزمن دي. واکسینونه جزئي جانبي عوارض لري، لکه د واکسین لگولو په ځای کې درد او یا خفیفه تبه. دغه جزئي نښې نښانې طبیعي دي او داسې باید وانگېرل شي چې بدن معافیت رامنځ ته کوي. د اندېښنې وړ غبرگونه ډېر نادر دي. د یوه واکسین ترلاسه کوونکی شخص باید د هغه له گټو او خطرونو څخه باخبره وي. که هر ډول پوښتنې یا اندېښنې لرئ، خپل د روغتیايي پاملرنې خدماتو وړاندې کوونکي سره وغږېږئ.

هغه تي خور ماشومان چې د HBV مثبتو میندو څخه زیږېدلي وي د انفیکشن مخنیوي لپاره اضافي پاملرنې ته اړتیا لري.

دا ماشومان په لاندې عمرونو کې د هپاتایټ بی امیون گلوبولین (HBIG) او اضافي ازموینې ته اړتیا لري:

زېږون:

له زېږون وروسته تر 12 ساعتونو پورې د هپاتایټ B واکسین د زېږون دوز او د HBIG یو دوز

1 - 2 میاشتي:

د HBV واکسین دویم دوز

6 میاشتي:

د HBV واکسین دریم دوز

9 - 12 میاشتي:

د روغتیايي پاملرنې خدماتو وړاندې کوونکي د وینې ټسټونه اخلي ترڅو د HBV پر وړاندې د خونديتوب تر لاسه کېدنه تایید کړي

