

Вакцинация от гепатита В

Вакцинация от гепатита В рекомендована всем младенцам и обеспечивает пожизненную защиту.

Ваш ребенок должен пройти прививку от гепатита В в следующем возрасте:

- рождение
- 1–2 месяца
- 6–18 месяцев

Вакцины: лучший способ профилактики заболеваний.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему лечащему врачу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИВИВКАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТАХ

- hhs.iowa.gov/public-health/immunization
- www.immunize.org
- www.cdc.gov/vaccines
- www.aap.org

Вакцинация от гепатита В

Сделайте прививку и измените свою жизнь к лучшему!



Health and
Human Services
Public Health



Health and
Human Services
Public Health

ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ В?

Гепатит В — это серьезное заболевание, которое поражает печень и может вызывать печеночную недостаточность, рак печени и приводить к смерти. Однако гепатит В можно предотвратить при помощи безопасной и эффективной вакцины.

КАК ЛЮДИ ЗАРАЖАЮТСЯ ГЕПАТИТОМ В?

Вирус гепатита В присутствует в крови и телесных жидкостях людей, больных гепатитом В. Вирус гепатита В может передаваться от матери к ребенку при рождении. Вирус гепатита В также может передаваться через совместное использование предметов обихода:

- зубные щетки
- бритвенные лезвия
- иглы для нанесения татуировок и пирсинга
- незащищенный секс

Контакт с инфицированной кровью даже в небольших количествах может привести к заражению. Вирус гепатита В не передается при кормлении грудью, кашле, чихании, объятиях и поцелуях.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У МЕНЯ ГЕПАТИТ В?

Все беременные женщины сдают анализ крови для скрининга на гепатит В в первом триместре каждой беременности. Это важный шаг для предотвращения передачи вируса гепатита В ребенку во время родов. По поводу результатов анализа на гепатит В проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ПРОШЕЛ ВАКЦИНАЦИЮ ПРИ РОЖДЕНИИ.

Так называемая «родовая доза» — это первая доза вакцины от гепатита В, которую ребенок получает непосредственно после рождения. Это необходимо для того, чтобы защитить новорожденных от инфицирования гепатитом В. Заражение гепатитом В может привести к хронической инфекции печени, что чревато пожизненным риском повреждения печени и рака печени. Три дозы вакцины от гепатита В защитят вашего ребенка от вируса гепатита В. Вакцинация от гепатита В рекомендована и безопасна для недоношенных детей.

НАСКОЛЬКО ПРИВИВКИ БЕЗОПАСНЫ?

Прививки в США безопасны и эффективны. Распространенные побочные эффекты прививок носят легкий характер и включают в себя боль в месте укола или слабую лихорадку. Подобные легкие симптомы являются вполне ожидаемыми и обусловлены нормальным иммунным ответом организма. Серьезные реакции встречаются крайне редко. Каждый человек, который проходит вакцинацию, должен быть полностью проинформирован о потенциальных преимуществах и рисках. Любые вопросы и опасения следует обсудить со своим лечащим врачом.



Новорожденным, родившимся от матерей, инфицированных вирусом гепатита В, необходим дополнительный уход для предотвращения заражения.

Таким малышам необходим иммуноглобулин против гепатита В (HBIG) и дополнительные анализы в возрасте:

ПРИ РОЖДЕНИИ:

При рождении ребенок должен получить дозу вакцины от гепатита В и дозу HBIG в течение 12 часов после родов

1–2 МЕСЯЦА:

2-я доза вакцины против гепатита В

6 МЕСЯЦЕВ:

3-я доза вакцины против гепатита В

9–12 МЕСЯЦЕВ:

Врачи берут кровь на анализ, чтобы подтвердить наличие защиты от вируса гепатита В.

