

Вакцина проти гепатиту В

## Вакцина проти гепатиту В рекомендована для всіх немовлят і забезпечує захист протягом усього життя.

Ваша дитина повинна отримати вакцину проти гепатиту В у такому віці:

- При народженні
- 1–2 місяці
- 6–18 місяців

## Щеплення: найкращий спосіб для профілактики захворювань.

Якщо у вас є запитання про щеплення, поставте їх своєму лікарю.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЩЕПЛЕННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖНА ЗНАЙТИ НА ВЕБСАЙТАХ:

- [hhs.iowa.gov/public-health/immunization](https://hhs.iowa.gov/public-health/immunization)
- [www.immunize.org](https://www.immunize.org)
- [www.cdc.gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines)
- [www.aap.org](https://www.aap.org)



Health and  
Human Services  
Public Health

## Щеплення проти гепатиту В

Зробіть щеплення і змініть своє життя на краще!



Health and  
Human Services  
Public Health

## ЩО ТАКЕ ГЕПАТИТ В?

Гепатит В (HBV) — це серйозне захворювання, яке вражає печінку та може викликати печінкову недостатність, рак печінки та смерть. Однак HBV можна попередити за допомогою безпечної та ефективної вакцини.

## ЯК ЛЮДИ ЗАРАЖАЮТЬСЯ ГЕПАТИТОМ В?

Вірус гепатиту В (ВГВ) виявляється в крові та біологічних рідинах людей, які інфіковані цим вірусом. HBV може передаватися від матері до дитини при народженні. HBV також може поширюватися через спільне користування такими предметами:

- зубні щітки;
- бритви;
- голки для татуювання та пірсингу;
- через незахищений секс.

Контакт навіть з невеликою кількістю інфікованої крові може спричинити інфекцію. HBV не поширюється через годуванням грудьми, при кашлі, чханні, обіймах або поцілунках.

## ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є У МЕНЕ HBV?

Усі вагітні жінки протягом першого триместру кожної вагітності повинні проходити аналіз крові на HBV. Це важливий крок для запобігання поширенню HBV до вашої дитини при її народженні. Запитайте свого лікаря про результати вашого аналізу на HBV.

## ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАША ДИТИНА ОТРИМАЛА ЩЕПЛЕННЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ.

«Доза при народженні» — це перша доза вакцини проти гепатиту В, яка вводиться немовлятам одразу після народження. Це робиться для захисту від інфекцій ВГВ у новонароджених. Інфекція, викликана вірусом гепатиту В, може призвести до хронічної інфекції печінки, що веде до ризику ураження печінки та раку печінки протягом усього життя. Три дози вакцини проти гепатиту В захистять вашу дитину від HBV. Рекомендована вакцина проти гепатиту В є безпечною для недоношених дітей.

## ЧИ БЕЗПЕЧНІ ВАКЦИНИ?

Щеплення у США є безпечними та ефективними. Часті побічні ефекти вакцин є неістотними та включають болючість у місці введення вакцини або незначне підвищення температури тіла. Такі незначні симптоми є нормальними і їх слід очікувати, оскільки організм формує імунітет. Серйозні реакції виникають дуже рідко. Кожен, хто отримує вакцину, повинен бути повністю проінформований як про її користь, так і про ризику. Будь-які запитання або проблеми слід обговорити з вашим лікарем.



## Немовлятам, народженим від матерів, інфікованих вірусом гепатиту В, необхідний додатковий догляд для запобігання зараженню.

Таким малюкам необхідний імуноглобулін проти гепатиту В (HBIG) і додаткові аналізи у віці:

### ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ:

Доза вакцини проти гепатиту В одразу після народження та доза HBIG протягом 12 годин після народження

### 1–2 МІСЯЦІ:

2-а доза вакцини проти ВГВ

### 6 МІСЯЦІВ:

3-я доза вакцини проти ВГВ

### 9–12 МІСЯЦІВ:

Медичні працівники проводять аналізи крові для підтвердження захисту від ВГВ

