

Вакцина проти HPV

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — це поширений вірус, який може викликати рак. Вакцина проти HPV є ключем до профілактики раку.

Вакцина проти HPV запобігає інфекціям, викликаним найбільш шкідливими типами вірусу папіломи людини. Вакцина є безпечною та ефективною і рекомендується як для хлопців, так і для дівчат віком від 11 років, але її можна вводити, починаючи з 9 років.

Вакцина є найефективнішою при введенні в ранньому підлітковому віці — це дає достатньо часу для розвитку імунітету, що означає кращий захист під час дорослішання.

Щеплення: найкращий спосіб для профілактики захворювань.

Якщо у вас є запитання про щеплення, поставте їх своєму лікарю.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЩЕПЛЕННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖНА ЗНАЙТИ НА ВЕБСАЙТАХ:

- hhs.iowa.gov/public-health/immunization
- www.immunize.org
- www.cdc.gov/vaccines
- www.aap.org



Health and
Human Services
Public Health

Щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Зробіть щеплення і змініть своє життя на краще!



Health and
Human Services
Public Health

ЩО ТАКЕ HPV?

HPV передається при статевому контакті, навіть якщо інфікована людина не має ознак або симптомів захворювання. У більшості випадків інфекція, викликана HPV, минає самостійно, і люди, інфіковані вірусом, ніколи не визнають, що вони її мали. Однак коли інфекція, спричинена ВПЛ, не проходить, вона може спричинити проблеми зі здоров'ям, як-от генітальні бородавки та рак. Рак часто розвивається через роки після інфікування людини HPV. HPV може мати багато серйозних наслідків як для чоловіків, так і для жінок, включаючи:

- рак шийки матки;
- рак статевого члена;
- рак вульви;
- рак горла та генітальні бородавки.
- рак піхви;
- рак ануса;

ФАКТИ ПРО HPV

- 79 мільйонів американців зараз інфіковані HPV
- 14 мільйонів людей інфікуються HPV щороку
- за приблизними оцінками онкологічні захворювання, спричинені інфекцією ВПЛ, щорічно діагностують у 36 500 людей у США
- 90% випадків раку, спричинених ВПЛ, можна було б запобігти за допомогою вакцинації від ВПЛ, і це приблизно 33 700 випадків у США щорічно
- за оцінками American Cancer Society, у США очікується приблизно 12 000 нових випадків раку шийки матки на рік, до того ж близько 4000 жінок щорічно помирають від цього захворювання

ПРОФІЛАКТИКА HPV

Вакцина проти HPV є найбільш ефективною в осіб, які завершили вакцинацію до контакту з HPV. Щеплення від ВПЛ рекомендується для хлопчиків і дівчаток у віці 11–12 років, але може бути зроблено вже в 9 років. Старшим підліткам і молодим дорослим рекомендується зробити щеплення повторно.

СКІЛЬКИ ДОЗ ВАКЦИНИ ПРОТИ HPV ПОТРІБНО?

Курс щеплень проти HPV складається з двох або трьох доз протягом 6-місячного періоду та може вводитися одночасно з іншими вакцинами. Для забезпечення повного захисту необхідний повний курс щеплень проти HPV. Для повного захисту від інфекції необхідно пройти повний курс щеплень від ВПЛ.

ЧИ Є ВАКЦИНА ПРОТИ HPV БЕЗПЕЧНОЮ?

Щеплення у США є безпечними та ефективними. Часті побічні ефекти вакцин є неістотними та включають болючість у місці введення вакцини або незначне підвищення температури тіла. Такі незначні симптоми є нормальними і їх слід очікувати, оскільки організм формує імунітет. Серйозні реакції виникають дуже рідко. Кожен, хто отримує вакцину, повинен бути повністю проінформований як про її користь, так і про ризики. Будь-які запитання або проблеми слід обговорити з вашим лікарем.

ЗАПИСИ ПРО ЩЕПЛЕННЯ

Підтвердження проведення щеплень може бути необхідним протягом усього життя. Поговоріть зі своїм лікарем про введення даних щодо щеплень в систему реєстру імунізації штату Айова (IRIS) та отримайте копії своїх записів.

Рак шийки матки є четвертим найпоширенішим видом раку у жінок у всьому світі, і за приблизними оцінками на нього припадає понад 604 000 нових випадків і 342 000 смертей на рік.

