



## د سرب/ليډ مسموميت يا زهري کېدل 100% د مخنيوي وړ دی

د خوړو، سپک خواړو او ويده کېدو څخه مخکې د خپل ماشوم لاسونه ومنيځئ.



د رنگ ټوټې کول يا پوستکي کول مرمت کړئ.



د لوبو سامانونه، بوتلونه او پيسيفايرونه يا چوشنې ډېر ځله ومنيځئ.



د لوبو سيمې د لمدې ټوکر او لمدې جارو سره پاکې کړئ.



هغه خواړه خدمت کړئ چې په زياته اندازه اوسپنه، کلسيم او ويتامين سي لري.



له وارد شويو خواړو، لوبو شيانو، کاسميټيکس او کورنيو درملنو څخه ډډه وکړئ.



د څښاک، پخلي او بوتلونو تيارولو لپاره د نل سري اوبه وکاروئ.



## خپل ماشومان د سرب/سيسي له زهري کېدو څخه وساتئ



Health and  
Human Services  
Public Health



Health and  
Human Services  
Public Health

د *Childhood Lead Poisoning Prevention Program* پانې ته په [hhs.iowa.gov](https://hhs.iowa.gov) مراجعه وکړئ يا يا د ماشومتوب د سرب زهري کېدو يا مسموميت مخنيوي په اړه د نورو معلوماتو لپاره 1-800-972-2026 شميرې ته زنگ ووهئ.

## د سرب مسمومیت یا زهري کېدل له څه شي رامنځته کېږي؟



ماشومان کیدای شي د سرب له زهري موادو سره مخ شي، که چیرې هغوی د 1978 کال څخه مخکې جوړ شوي کورونو کې ژوند کوي یا لیدنه کوي. د سرب نورې سرچینې کېدای شي دا وي:

- ◀ پخواني قيمتي توکي (انتيکونه)
- ◀ رنگ شوی نښینه (سټېن گلاس)
- ◀ د کور رغونه یا ترمیمات
- ◀ کيلي گانې
- ◀ د موټرو ترمیمات/ مرمتونه
- ◀ د کب نیولو وسایل/ مصنوعي طعمې
- ◀ وارد شوي خواړه (کینډي)
- ◀ مصالحې



پخواني قيمتي توکي (انتيکونه) په زرو کړکيو کې د د لاس ساخت خټو لوبڼي د پیتلو کيلي گانې د سرب رنگ

## د سرب د زهري کېدو یا مسمومیت نښې نښانې کومې دي؟

ډېری ماشومان چې د سرب مسمومیت لري ممکن ناروغه نه ښکاري، مگر ځینې نښې نښانې کې یې شاملې دي:



- ◀ ژر هیجاني یا ژر خوشېدونکی کېدل
- ◀ ژر قاریدنه
- ◀ د تمرکز/پاملرنې ستونزې
- ◀ د زده کړې ستونزې یا مشکلات
- ◀ د معدې خرابوالی او کانګې
- ◀ د وزن کمېدل
- ◀ د سر درد
- ◀ د ودې یا پرمختیايي ځنډونه
- ◀ د وډې یا پرمختیايي ځنډونه
- ◀ د معمول څخه زیاته ستړیا

سپارښتنه کېږي چې ټول ماشومان د 12 او 24 میاشتو په عمر کې معاینه شي او د ماشوم روغتیا په هره لیدنه کې باید د خطر لپاره وارزول شي.



## د وینې د سرب/لیډ معاینات څنگه کار کوي؟

د وینې د سرب/لیډ دوه ډوله معاینات شتون لري: کیپیلري او وینس. د کیپیلري ټیسټ یا معاینه د کوتې څخه د سرب لپاره سکرین ته د وینې لږ مقدار کاروي، پایلې په څو دقیقو کې شتون لري. که چیرې د کیپیلري ټیسټ یا معاینه وښيي چې سرب شتون لري، د وینس یا رگونو د وینې معاینه، چې له لاس څخه اخیستل کېږي، به د وینې د سرب کچه تایید کړي.

## ستاسو د ماشوم د وینې د سرب کچه

\_\_\_\_\_ د وینې د لیډ کچه په هر ډیسی لیتر کې

\_\_\_\_\_ مایکروگرام (µg/dL) لري

د وینې د سرب د کچې لپاره چې له 3.5 µg/dL څخه کمه وي، هیڅ اقدام ته اړتیا نشته. د چاپیریالي سرب/لیډ خطرونو سره د احتمالي مخ کیدو څخه خبر اوسئ.

د وینې د سرب/لیډ کچې لپاره چې د 3.5-9 µg/dL ترمنځ وي، د خپل برابرۍ/چمتو کونکي څخه د سرب یا د لیډ سرچینو پیژندلو او د ښه تغذیې او کور ساتنې اهمیت په اړه پوښتنه وکړئ.

د وینې د سرب/لیډ کچه د 10 µg/dL یا لوړې لپاره، ستاسو ماشوم اضافي تعقیبي پاملرنې (فالو اپ) ته اړتیا لري. د بیا ازموینې د سم وخت لپاره لاندې وگورئ.

## ستاسو د ماشوم پایلې

پایله	د وینوس ټیسټ/ازموینې نېټه
10-14	د 3 میاشتو دننه
15-19	د 1 میاشتې دننه
20-44	د 1 اونۍ دننه
45-69	د 48 ساعتونو دننه
70 یا لوړ	فوري/سمدستي

ستاسو ماشوم باید د دې نېټې پورې معاینه/ازموینه وشي: \_\_\_\_\_